

Mes a Mes	Temáticas	Tambos en general - Puntos a tener en cuenta en el mes
A G O S T O	Características generales del mes	El Mes más seco del año, sigue el frío y las heladas, aunque en general disminuye la intensidad.
	Manejo de pasto y alimentación	La frecuencia de pastoreo de festuca se va acortando a 25 días, y en plena encañazón habrá que volver cada dos semanas. Ver necesidad de desmalezado en las festucas de encañado más temprano.
		Recordar realizar mantenimiento a la desmalezadora, cuchillas, hidráulico, engrasar, etc.
		Tener presente estudiar la apertura de nuevos silos ya que luego de medidos de Agosto en algunos tambos puede aparecer el pasto y deteriorarse el silo.
	Calidad de leche	Las mediciones de pasto se deben hacer entre las 8 am y 12 del mediodía, para evitar tanto el rocío y la humedad que se acumula sobre el pasto en horas tempranas, como la pérdida de agua que ocurre en horas más avanzadas.
		En los establecimientos modelo del Grupo se realizan despuntes semanales para poder tener un mejor control de la presencia de patógenos en las ubres. La frecuencia es determinada según el criterio del Socio Tambero (Siendo frecuente la metodología de 2 despuntes semanales). Se considera necesaria la presencia del Socio Tambero los días de despunte para poder tener un mayor control sobre el análisis.
	Agricultura	Por rutina realizamos 4 controles lecheros al año, el primero cuando terminan las pariciones y luego cada dos meses. (verificar antes que todas tengan Bolo y CV)
		Efectuar la fertilización de N y S para cuando mejore la temperatura del suelo.
		Ir definiendo los verdeos que se van a quemar temprano para la siembra de maíz, hacerlo antes de fin de mes.
	RRHH	Preparar insumos para la cosecha gruesa. Analizar semilla.
Si a uno le interesa el bienestar de la gente que trabaja con uno, sean empleados, asesores o socios, es muy probable que ellos se interesen por el bienestar de la empresa. Para que perdure el interés debe ser genuino.		
	El objetivo principal para cada puesto de trabajo es el de mantener una vida gratificante; y para esto, es importante la buena relación entre empleadores y empleados como así también entre los empleados. Para lograr ambas cosas, se busca contar con un equipo de personas capaces, motivadas y voluntariosas.	

Mes a Mes	Temáticas	Parición de junio a agosto
A G O S T O	Situación más relevante de c/Tambo según época	Terminando Pariciones. Inicio de IA en Vq desde mediados de mes.
	Manejo de pasto y alimentación	Se va finalizando la alimentación parto, se unifica el rodeo a parir que queda. Se agrupan los rodeos por Reproducción o por Producción según sea prioritario para el tambo (o por fecha de paridas o por Producción según ultimo Control Lechero)
		Se prepara todo para el pico de producción de sólidos en Septiembre.
	Parición	Ir completando Planilla de Parición (y compartir)
	Guachera	Se van deslechando Piquetes con 60 días de vida. Es sumamente importante el CRITERIO DEL GUACHERO a la hora de los desleches, es él quien debe constatar que las terneras se encuentren consumiendo alimento balanceado en forma moderada y que su estado corporal les permitirá disminuir la toma sin sufrir problemas de empachos. Hacer piquete de "atrasadas" si hace falta seguir dando leche un tiempo más.
	Recría	Se pesa la recría del año anterior, debería estar pesando 250-260 kg para entrar en servicio.
	Sanidad y Reproducción	Las terneras deslechadas (60 días) se descornan, descolan y vacunan contra mancha gangrena y enterotoxemia.
		Evaluar raspaje y chequeo de toros.
Organizar la compra de insumos de IA		
Vacunación en Guachera según días de vida: 21 días contra Neumonía; 40 días se repite Neumonía y Querato; 60 días la Triple; 90 días se repite la Triple y Querato.		
	Comienzo de la IA de vaquillonas.	

Mes a Mes	Temáticas	Parición de enero a abril
A G O S T O	Situación más relevante de c/Tambo según época	Producción, Condición Corporal de las Vc y Vq Preñadas y cuidado de la Recría.
	Recría	Si no se comenzó todavía, ya se debería hacer el primer Control de Pesaje de las terneras de este año.
	Sanidad y Reproducción	Ya debería haberse realizado el primer Tacto, tanto en vacas como en vaquillonas, compartir info.
Se podrían empezar a vacunar las terneras por Brucelosis		