

Mes a Mes	Temáticas	Tambos en general - Puntos a tener en cuenta en el mes
<b>A B R I L</b>	<b>Características generales del mes</b>	Otoño definido, normalmente bien de lluvias, vienen las primeras heladas.
	<b>Manejo de pasto y alimentación</b>	Se empieza a cuidar el "bocado de verde", los crecimientos de pasturas van bajando a 20-25 kg salvo los verdeos de invierno en los años de buen clima, puede seguir habiendo buena participación de trébol blanco. Se va aumentando la suplementación, se abren los silos.
		Se empieza a mirar con cariño cualquier tipo de fibra que pudiera estar en el campo todavía en uso (rastros de maíz o sorgo por ejemplo).
		<b>Control de plagas sobre todo en las praderas nuevas sembradas a fines de marzo y este mes; trips, pulgón, etc.</b>
	<b>Sanidad y Reproducción</b>	Recordar que si se hace barrial profundo en alguna parte del camino de las vacas es mejor abrir una pasada por el costado desviando por dentro de un lote para que circulen con las ubres limpias y cerrar el barrial hasta que se pueda terraplenar.
<b>Agricultura</b>	Enrollar colas de cosecha de soja o sorgo cuando luego se va a pastura nueva en directa. También se pueden dejar para ir comiendo si se ve que es tarde para lograr buenos VI sobre los rastros de maíz-sorgo que no van a PN (praderas nuevas).	
	Se termina de hacer la fertilización con nitrógeno y reposición con fósforo y azufre según las evaluaciones efectuadas con los análisis de suelo y planta.	
	Sembrar las praderas nuevas.	
<b>RRHH</b>	Realizar la compra de ropa de trabajo del personal para el invierno.	

Mes a Mes	Temáticas	Parición de enero a abril
<b>A B R I L</b>	<b>Situación más relevante de c/Tambo según época</b>	La parición debiera estar 85-90% cumplida, se evalúa si conviene inducir las vacas que van a parir luego de mediados de mes; las "vacías de otoño" de buena producción se van a tambos de invierno, ya sean preñadas o vacías en ordeño, la producción suele andar entre los 21-23 litros, el % de sólidos sigue bajando a un mínimo, la proteína llega a 3,55-3,6%.
	<b>Manejo de pasto y alimentación</b>	Se va finalizando la alimentación parto, se unifica el rodeo a parir que queda. Se agrupan los rodeos por reproducción.
		Las terneras nacidas a fines de enero, ya debieran estar consumiendo solo alimento, deslechadas y las de febrero comiendo alimento en el orden de los 500 grs y encaminadas para deslechar sobre fines de mes. Se usa alimento pre-iniciador en las nacidas últimas para apurar su desleche y cerrar la parte de leche de la guachera.
	<b>Recría</b>	Se pesan las terneras de otoño del año anterior, deberían estar por los 250-270 kg.
	<b>Sanidad y Reproducción</b>	Se va preparando todo el material para la IA de las vaquillonas para el 1 del mes de Mayo y para las vacas el 15 de mayo.
Hacer un tacto a principios de mes para confirmar si las que flatan parir están realmente todas preñadas, suele suceder que se pasa alguna parida que no bajó ubre o un aborto no visto.		
Las vacas "vacías de otoño", muchas de ellas preñadas de invierno deben haber ido a otros destinos a medida que se va completando el número de VO previsto con las paridas.		
	Evaluar raspaje y chequeo de toros.	

Mes a Mes	Temáticas	Parición de junio a agosto
<b>A B R I L</b>	<b>Situación más relevante de c/Tambo según época</b>	Entrando en los meses finales de ordeño, se reciben las "vacías de otoño" de buena producción que empiezan a sobrar en los tambos de otoño, que puedan estar preñadas para invierno o vacías en ordeño, la producción suele andar en los 14-15 litros. Comienzan de a poco los secados.
	<b>Manejo de pasto y alimentación</b>	Se va adaptando la alimentación a los menores requerimientos del rodeo, cuidando de que no baje de estado corporal.
	<b>Guachera</b>	Se van preparando las parcelitas para la guachera, se chequean las bebidas, alambres, tranqueras, manguita, etc. Desinfectar en caso de ser necesario.
	<b>Recría</b>	Se pesan las terneras de invierno del año anterior, deberían estar por los 180-190 kg. Se vacunan con bioabortogen primera dosis.
	<b>Sanidad y Reproducción</b>	Se va preparando todo el material para la IA de las VO vacías del servicio de primavera que haya en el rodeo del tambo y las enviadas de tambos de otoño.
		Especial atención en recorrer vaquillonas y registrar abortos y llevar a ordeño las que bajan ubre luego de abortar. Acostumbrarlas a la sala de ordeño, revisar ubres.
		Según el valor de la leche y los costos de ordeño evaluar con que nivel de producción por día conviene secar.
		Evaluar lugares donde se va a concentrar el rodeo parto y que van a comer de alimento base para definir con el nutricionista el tipo de suplementación a utilizar para evitar problemas de hipos.
		Para el comienzo de los secados, recordar que, a más lactancias, menos tiempo de secado necesita la ubre, pudiendo llegar desde los 60 días las vacas de segundo parto a 35 días en las vacas de 5ta parición para arriba.
		Al ir secando ir dando destino a los descartes ya decididos por motivos no productivos como crónicas de mastitis, renegas crónicas, etc.
	Se realiza el tacto a las vacas pre secado, para no secar vacas que hayan abortado.	
	Vacunamos al secado las vacas contra diarrea neonatal y neumonía para obtener un calostro rico en anticuerpos.	
	Se vacuna a las vaquillonas 1° dosis contra diarrea neonatal y neumonía.	
<b>Administración</b>	Se presupuesta y compran los insumos para la parición y guachera.	
	Se hacen las compras del alimento base parto y de los subproductos y minerales a usar ya definidos con el nutricionista.	
	Revisar a fondo la maquinaria de ordeño y frío, puesta a punto de las mismas.	